


Nachrichtenblatt

für den Deutschen Pflanzenschutzdienst



12. Jahrgang Nr. 10	Herausgegeben von der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem	Berlin, Anfang Oktober 1932
	Erscheint monatlich / Bezugspreis durch die Post vierteljährlich 2,70 R.M	
	Ausgabe am 5. jeden Monats. Bis zum 8. nicht eingetroffene Stücke sind beim Bestellpostamt anzufordern	
	Nachdruck mit Quellenangabe gestattet	


Die starken Schäden an Getreide im Jahre 1932

Zusammengestellt nach den bis Ende September bei der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem, eingegangenen Meldungen (Laboratorium für Meteorologie und Phänologie).
Berichterstatte: Regierungsrat Dr. Voelke l.


Heflige Gewitterregen während des Sommers 1932 hatten an vielen Orten des Reiches mannigfache R ä s s e -schäden zur Folge. Insbesondere lagerte das Getreide stark (vgl. Karte I). Meldungen darüber liegen vor aus Han-

(Kr. Coesfeld 25 %), Rheinprovinz (Kr. Mülheim/Ruhr bis 40 %, Koblenz bis 100 %), Baden.
Die Gewitter waren oft mit Hagel verbunden, der mehrfach erheblichen Schaden anrichtete, so in Hannover

Karte I



Karte II



nover (Kr. Syke bis 60 %, Hümmling 30 %), Oldenburg, Mecklenburg, Pommern, Ostpreußen, Grenzmark (Kr. Landsberg a. W. 40 bis 50 %), Schlesien (Kr. Jauer 25 %), Brandenburg (Kr. Cottbus 33 %, Jüterbog-Luckenwalde 50 %), Provinz Sachsen (Kr. Naumburg 60 %, Saalkreis 60 %), Anhalt, Freistaat Sachsen, Thüringen, Hessen-Nassau (Kr. Rotenburg 20 %, Marburg 60 %), Westfalen, Rheinprovinz (Kr. Rees bis 30 %, Grevenbroich-Neuß bis 50 %), Baden, Württemberg (D.-A. Neckarsulm 33 bis 40 %).


(Kr. Gifhorn bis 50 %, Hildesheim 20 bis 60 %, Duderstadt bis 50 %), Pommern, Ostpreußen (Kr. Ortelsburg 25 %), Grenzmark, Schlesien (Kr. Ramslau 100 %, Glatz 20 bis 30 %), Brandenburg (Kr. Angermünde bis 80 %), Freistaat Sachsen, Thüringen, Westfalen (Kr. Steinfurt 50 bis 100 %, Münster 40 bis 50 %), Rheinprovinz (Kr. Köln bis 90 %, Mayen 90 %, Saarburg 20 %), Baden (AB. Konstanz 30 bis 50 %), Württemberg, Bayern.

Weitere R ä s s e -schäden durch Überschwemmungen, Versandungen usw. (vgl. Karte II) meldeten Hannover, Schleswig-Holstein, Pommern, Ostpreußen (Kr. Böken 30 bis 75 %, Johannisburg 40 %, Gerdauen 25 bis 90 %, Niederung 80 %, Tilsit-Ragnit 70 bis 80 %, Pillkallen 50 bis 90 %, Stallupönen 40 bis 100 %, Gumbinnen 30 bis 100 %, Insterburg 40 bis 90 %, Darkehmen 50 bis 80 %, Goldap 50 bis 90 %, Lyck 75 %, Sensburg 40 %, Ortelsburg 50 %), Grenzmark (Kr. Flatow 25 bis 30 %), Oberschlesien, Anhalt, Hessen-Nassau, Westfalen

Nur wenige stärkere Dürre Schäden (vgl. Karte II) meldeten Hannover, Schleswig-Holstein, Lübeck, Mecklenburg, Pommern, Ostpreußen, Grenzmark, Niederschlesien, Brandenburg, Provinz Sachsen, Westfalen und Rheinprovinz.
Schäden durch Frost, Auswinterung, Bodensäure sowie Krankheiten und Schädlinge, die z. T. stark vorkamen, jedoch nur von lokaler Bedeutung waren, wurden in dieser Zusammenstellung nicht berücksichtigt.
Alle eingegangenen Meldungen mit Angabe in Prozenten über Ernteverluste und Schäden sind in der Zusammenstellung aufgeführt, auch wenn die betreffenden Krankheiten bzw. Schädlinge nicht stark aufgetreten sind.

Meldungen über starkes Auftreten von »Getreiderost« ohne nähere Angabe der Rostart (vgl. Karte III) lagen vor aus Hannover, Mecklenburg,

Karte III



Pommern. Ostpreußen meldete verbreitetes und sehr starkes Auftreten an allen Getreidearten, »besonders an Hafer und Roggen, weniger stark an Weizen, fast gar nicht

an Gerste« (Kr. Mohrungen); »an Hafer im ganzen Kreis (Kr. Holland) durchschnittlich 30 %«. Sehr starkes Auftreten an Weizen wurde festgestellt in Ostpreußen (Kr. Olekto bis 70 % Verlust, Sensburg, Marienwerder, Rosenberg), Nieder- und Oberschlesien, starkes in Hannover, Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Brandenburg, Freistaat Sachsen und Rheinprovinz. Der Rost trat ferner stark auf an Gerste in Hannover und Mecklenburg, an Hafer in Pommern, Ostpreußen (Kr. Elbin, 30 %) und Brandenburg und an Roggen in Pommern (»der ganze Kreis Bütow befallen«), Brandenburg, Provinz Sachsen und Westfalen.

Gelbrost (*Puccinia glumarum*) trat vereinzelt stark auf an Gerste in der Provinz Sachsen und an Weizen in Oldenburg und Thüringen.

Braunrost war stellenweise sehr stark an Gerste in Unterfranken, an Roggen in Hannover und Württemberg und an Weizen in Hannover, Oldenburg, Nieder- und Oberschlesien, Provinz Sachsen, Anhalt, Thüringen, Baden, Württemberg und Bayern.

Schwarzrost (*Puccinia graminis*) war verbreitet und vielfach sehr stark an Weizen in Ostpreußen und Niederschlesien, stellenweise stark in Mecklenburg, Westfalen, Württemberg, Oberpfalz und Unterfranken, an Roggen in Schleswig-Holstein und Ostpreußen, an Gerste in Ostpreußen und Württemberg sowie an Hafer in Hannover.

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen

Weitere Ausbreitung des Kartoffelkäfers in Frankreich

Nach französischen Zeitungsmeldungen.

Im »Intransigeant« vom 17. Juli 1932 berichtete ein Sonderkorrespondent aus Limoges, daß im Departement Haute-Vienne, wo die Zahl der Kartoffelkäferherde im Herbst 1931 auf 4 000 angewachsen war, im Mai dieses Jahres sich zunächst nur wenig oder gar keine Larven, und zwar auf nur einigen hundert Befallsstellen gezeigt hatten. Die Ursache war in dem schlechten Wetter zu suchen, das das Auskriechen der ersten Brut verzögert oder die Käfer in ihren Erdverstecken zurückgehalten hatte. In der ersten Julihälfte erschien aber der Käfer unter dem Einflusse des warmen Wetters allenthalben, und die neuen Schädlingsherden vermehrten sich mit Geschwindigkeit. U. a. trat das Insekt auch in den Gärten der Stadt Limoges auf, wo es im vergangenen Jahre nicht zu bemerken gewesen war. Über die Stärke des Befalls im Departement Haute-Vienne, in das der Schädling aus der Dordogne zugewandert ist, sagen die französischen Sachverständigen, daß zwar das ganze Departement befallen sei, der Schädling aber im Nordostteil bisher kaum Schaden angerichtet habe. Der Südsüdwestteil sei dagegen vollkommen verseucht. »Die Arrondissements von St. Vrieux, Rochechouart, Confolens und Montbron scheinen das Paradies des Kartoffelkäfers zu bilden. Wenn man ihn eines Tages überall vertrieben haben wird — falls man jemals dazu kommen sollte —, würde man sicher sein, ihn noch dort zu finden.« Nach einigen Angaben über die Organisation der Bekämpfung des Kartoffelkäfers im Departement Haute-Vienne, für die 1 700 Spritz- und Stäubegeräte bei den Bürgermeistereien der am meisten heimgesuchten Gemeinden bereitstehen, enthält dieselbe Nummer des Blattes folgende Mitteilung:

»Limoges, 16. Juli. Von unserem Sonderkorrespondenten). Die fortgesetzten Unwetter, die in unserer

Gegend niedergehen und der Landwirtschaft beträchtlichen Schaden zufügen, haben, was den Kartoffelkäfer anbelangt, unheilvolle Folgen. Sie machen den Kampf gegen die furchtbare Plage, die nicht aufhört ihre Verwüstungen immer weiter auszudehnen, nahezu unmöglich. Die Schädlingsherden vermehren sich mit unglaublicher Geschwindigkeit, und nicht selten trifft man Kartoffelfelder an, die zur Hälfte vernichtet sind.

Die Departements Haute-Vienne, La Creuse und La Corrèze, die bekanntlich große Mengen von Kartoffeln produzieren, sind fast ganz verseucht.

Am 26. Juli d. J. wurde in der »Information« über die Lage der französischen Landwirtschaft und über die diesjährigen Ernteaussichten berichtet. Dabei wurde mitgeteilt, daß das Vernichtungswerk des Kartoffelkäfers in Frankreich weiter fortgeschritten sei. Der Schädling habe sich in erstaunlicher Weise in der Vendée ausgebreitet und sei jetzt auch im Departement Maine-et-Loire. Die Zahl seiner Herden in Allier und La Creuse habe sich vervielfacht und das bedrohliche Auftreten des Schädlings in den Kartoffelkulturen sei nunmehr auch aus den Departements Nord und Seine-et-Oise gemeldet.

Wenn diese Nachricht sich bewahrheiten sollte, würde der Kartoffelkäfer im Departement Nord dem angrenzenden Belgien bedrohlich nahe gekommen sein. Aber sein Vorkommen im Departement Seine-et-Oise berichten auch die Zeitungen Deuvre und Matin vom 4. August d. J. Danach soll sich der Schädling in der Umgegend von Paris gezeigt haben. Eine Meldung der in Bordeaux erscheinenden Zeitung »La France« vom 21. August 1932 nach der das Vorkommen des Kartoffelkäfers in Mirval (Saône-et-Loire) seit dem 29. Juli d. J. festgestellt sei wurde durch den Leiter des französischen Pflanzenschutzdienstes Dr. Saulnier, auf Anfrage bestätigt. Damit sind nicht nur die im Osten angrenzenden Departements Jura und Ain, sondern auch die Schweiz nahe bedroht, da der Dr. Mirval nur 60 km von der Schweizer Grenze entfernt liegt.

M. Schwarz.

Eine Englische Bisamrattenverordnung ist am 31. März 1932 unter der Bezeichnung »Musk Rats (Importation and Keeping) Order, 1932« als »Section 1 of the Destructive Imported Animals Act, 1932« erlassen worden.

Bisamratten dürfen nach Großbritannien und Schottland nur mit besonderer Genehmigung des Ministers für Landwirtschaft und Fischerei oder des Landwirtschaftsministeriums für Schottland und unter den in der Genehmigung vorgeschriebenen Bedingungen eingeführt werden. Das Halten von Bisamratten ist in gleicher Weise genehmigungspflichtig und an die Erfüllung bestimmter Bedingungen geknüpft.

Der Geltungsbereich dieser Verordnung erstreckt sich auf England, Wales und Schottland. Sie ist mit dem 1. Mai 1932 in Kraft getreten.

Am 1. April 1932 sind unter der Bezeichnung »Musk Rats (Importation and Keeping) Regulations, 1932« als »Section 2 of the Destructive Imported Animals Act, 1932« Ausführungsbestimmungen, die ebenfalls für England, Wales und Schottland gelten und am 1. Mai 1932 in Kraft getreten sind, herausgegeben. Die in Großbritannien gehaltenen Bisamratten unterliegen demnach nicht nur bei der Einfuhr, sondern dauernd der genauen amtlichen Kontrolle. Über jedes Tier hat der Züchter Buch zu führen und den mit der Überwachung beauftragten Beamten Auskunft über den Verbleib jeder Bisamratte zu geben. Ferner enthalten die Ausführungsbestimmungen sehr ins einzelne gehende Vorschriften für die Bauart und Beschaffenheit der zum Versand und Halten zu verwendenden Behältnisse und Käfige sowie Muster für die Bescheinigungen über die Genehmigung der Einfuhr oder des Hagens von Bisamratten. C. v. W.

Katastrophales Auftreten von Weizenrost in Südosteuropa.

Wie die Zeitschrift »Industrie und Handel« in einer Reihe von Nummern im Juli und August berichtet, hat die Weizenernte in vielen Gebieten Polens, Bulgariens und Rumaniens schwer unter dem Weizenrost gelitten. Nach Mitteilung des polnischen Landwirtschaftsministeriums soll die Weizenernte in einigen der besten Weizenbezirke der Wojewodschaften Kielce, Lublin, Wolhynien, Krafau, Lemberg und Larnopol ganz vernichtet oder zum größten Teil verloren sein. Ernteverluste werden auf 70 bis 85, selbst 100 % geschätzt. Die Krankheit hat auch auf Gerste und Hafer übergegriffen. In den amtlichen polnischen Berichten wird sie als »Rostbrand«, aber auch als »Weizenbrand« bezeichnet, während in den bulgarischen und rumänischen Meldungen die Weizenmisernte nur auf Rostpilzbefall zurückgeführt wird. Es handelt sich also wohl um einen außerordentlich starken Rostbefall, der die Weizengebiete Südosteuropas heimgesucht hat. Die Krankheit trat auch in den direkt an der Donau gelegenen Bezirken Bulgariens auf; hier reicht die Ernte nicht einmal zur Deckung des Bedarfs an Saatgut. Die betroffenen Gebiete liefern in normalen Jahren rund $\frac{1}{3}$ der gesamten Getreideausfuhr des Landes. Um die Ernährung des Landes zu sichern, hat die Direktion für den Einkauf und Export von Getreide die Getreideausfuhr sofort eingestellt. In ganz Südrußland von Turn-Severin bis nach Galatz, d. h. in den Hauptproduktionszentren des Weizens ist die Ernte durch Rostpilze vermindert. Der geerntete Weizen zeigt vielfach geschrumpfte Körner und weist ein Hektolitergewicht von 62 bis 70 kg gegen normal 79 bis 80 kg auf. Klemm.

Motorverstäuber-Prüfung

Bei dem häufigen verheerenden Auftreten von Forstschädlingen in den letzten Jahren wurde die Bekämpfung derselben immer mehr mit Fraß- und Kontaktgiften durch-

geführt. Zur Verstäubung der pulverförmigen Gifstoffe wurden neben Flugzeugen auch Motorverstäuber verwendet. Von letzteren sind eine ganze Reihe von Typen entwickelt worden. Um Klarheit über die Eignung der vorhandenen Maschinentypen für forstliche Zwecke zu erhalten und auch Unterlagen für die künftige Weiterentwicklung der Apparate zu gewinnen, wurde vom Ausschuss für Technik in der Forstwirtschaft mit Unterstützung des Reichskuratoriums für Technik in der Landwirtschaft und unter Mitarbeit der Biologischen Reichsanstalt eine vergleichende Prüfung der wichtigsten auf dem Markt befindlichen Motorverstäuber durchgeführt. Das Ergebnis dieser Prüfung liegt in den »Mitteilungen des Ausschusses für Technik in der Forstwirtschaft« Heft 4, S. 123 bis 154, Juli 1932, veröffentlicht vor. Die Prüfung erstreckte sich über folgende Punkte: 1. Feststellung der technischen Eigenschaften der einzelnen Maschinen in der Praxis, 2. Untersuchung der Maschinen im Laboratorium auf ihre windtechnischen Eigenschaften, 3. Feststellung der Kosten sowie der Vorausschätzungen erfolgreicher Verstäubearbeit auf Grund eigener Beobachtungen und der Ergebnisse der Praxis. In dem Prüfungsbericht werden nach eingehender Beschreibung der neun geprüften Apparate unter Angabe ihrer technischen Eigenheiten die Ergebnisse der technischen Prüfung, die sich auf die Fortbewegung, die Verstäubungshöhe und ihre Regulierbarkeit, die durch den Ventilator erzeugte Luftgeschwindigkeit, die Stärke des Motors für den Ventilator, den günstigsten Wirkungsgrad des Gebläses, die Pulverzuführung und ihre Dosierbarkeit, die Geländefähigkeit u. a. erstreckten, mitgeteilt. — Die Kosten der Verstäubungsarbeit (Amortisation des Apparates, Betriebsstoff, Löhne für Arbeiter, Fuhrlohn usw.) eines selbstfahrenden Motorverstäubers ohne Kosten für das Bekämpfungsmittel werden auf etwa 5 R.M. je ha und Fahrt errechnet. Dieser Betrag hat im Vergleich zu den Kosten des Verstäubungsmittels, das mit mindestens 40 R.M. eingesetzt werden muß, nur eine untergeordnete Bedeutung. — Die organisatorischen Voraussetzungen einer Verstäubung werden in dem Bericht besonders hervorgehoben. Ein Bericht über die »Möglichkeiten und Grenzen der Verwendung von Motorverstäubern« von Ministerialrat Dr. K ü n k e l e ist angefügt. Hier werden kurz die Erfahrungen des in der Hauptsache mit 6 Flugzeugen durchgeführten erfolgreichen Kampfes gegen die Forsteule in Mittelfranken und Oberpfalz 1931, bei welchem 1 740 Str. Gifstaub mit 10 Motorverstäubern (8 »Auto-Sulfia« und 2 »Schering«) verstäubt wurden, mitgeteilt. Zu der Frage: Motorverstäuber oder Flugzeug nimmt K ü n k e l e mit folgenden Worten Stellung: Es »hat, je Hektar gerechnet, die Motorverstäubung den Vorzug wesentlich geringerer Kosten gegenüber der Arbeit mit Flugzeug. Es ist aber nicht zu verkennen, daß bei ausgedehnten Großschadensfällen die Vorbereitung und Durchführung der Motorverstäubung ohne Mitwirkung von Flugzeugen umständlicher und im Enderfolg unsicherer ist, als sie bei Mitwirkung von Flugzeugen sich gestaltet. — Man wird also in Kampfgebieten kleineren Ausmaßes sich auf Motorverstäubung beschränken; bei ausgedehnten Großschadensfällen wird man die Hauptarbeit den ausgiebiger, rascher und gleichmäßiger arbeitenden Flugzeugen überlassen, während die Motorverstäuber hierbei gleichzeitig insbesondere dort eingesetzt werden, wo die Flächen für Flugzeugverwendung zu klein, zu ungünstig geformt, zu umständlich zu erreichen (Flugplatz), zu gefährlich (Oberhälter) oder zu bergig sind«. Voelfel, Dahlem.

Aufhebung der innerstaatlichen Quarantänemaßnahmen gegen den Maiszünsler in den Vereinigten Staaten. Das United States Department of Agriculture, Washington,

hat in einer der Presse am 13. Juli 1932 übergebenen Erklärung bekanntgegeben, daß die von der Bundesregierung zur Bekämpfung und zur Verhinderung der Verschleppung des Maiszünslers (*Pyrausta nubilalis* Hb.) verhängte Sperre für Mais aus den verseuchten Gegenden mit Wirkung vom 15. Juli 1932 aufgehoben worden ist, nachdem der Kongreß zur Durchführung der Abwehrmaßnahmen an Stelle des geforderten Betrages von 795 000 Dollar lediglich 295 000 Dollar für das am 1. Juli 1932 begonnene Rechnungsjahr zur Verfügung gestellt hat. Das Department of Agriculture wird seine Tätigkeit im Interesse der Maiszünslerbekämpfung nach Maßgabe der verfügbaren Mittel darauf beschränken, die Verbreitung des Schädling zu beobachten und Anregungen zu seiner Bekämpfung zu geben, während die Verhinderung seiner Verschleppung in bisher unverseuchte Gegenden den interessierten Einzelstaaten überlassen werden muß.

Die Abwehr der Heuschreckenplage im mittleren Osten. Das gemeinsam von den Regierungen Palästinas, Syriens, Ägyptens und des Irak unterhaltene Institut zur Bekämpfung der Heuschreckenplage im mittleren Osten hat neuerdings Meldungen über das Auftreten von großen Schwärmen an der sudanesisch-ägyptischen Grenze sowie im Hedschas und im Nedschd erhalten, die ihre Flugrichtung nach Norden nehmen. Die Stelle führt bereits seit mehr als zwei Jahren einen harten und zum Teil schon erfolgreichen Kampf gegen die regelmäßig auftauchende Plage, die der Landwirtschaft dauernd schwere Schädigungen verursacht. Trotz des geringen Umfangs der zur Verfügung stehenden Gelder sind durch ihre Mitwirkung allein am Rande der Großen Syrischen Wüste über 14 1/2 Mill. kg der Schädlinge vertilgt worden.

(Industrie und Handel, Nr. 158 vom 9. Juli 1932, S. 3.)

Neue Druckschriften

Flugblätter der Biologischen Reichsanstalt Nr. 52. Die Herstellung kupfer-, arsen- und nikotinhaltiger Sprühbrühen für den Pflanzenschutz. Von Reg.-Rat Dr. G. Zillig und Dr. A. Herjchler. 3. Aufl. August 1932.

Nr. 57. Tierische Schädlinge an Hülsenfrüchtlern. Von Dr. R. Langenbuch. 4. Aufl. August 1932.

Begriffen sind z. B. folgende Flugblätter: 2, 3, 5, 8, 15, 18, 19, 21, 28, 39, 62, 95 und 96.

Aus der Literatur

Raumow, N. A. Mikroskopische Untersuchungsmethoden in der Phytopathologie. 224 S. mit 51 Abbildungen und 4 Tafeln. Staatsverlag Leningrad 1932. Preis 2,25 Rubel (russisch).

Das Werk des bekannten Phytopathologen stellt ein Handbuch für alle dar, die sich mit Untersuchungen auf dem Gebiete der Pflanzenkrankheiten beschäftigen. Es soll eine Lücke der für die Ausbildung der jüngeren Fachphytopathologen notwendigen russischen Literatur ausfüllen. Das Buch hat eine günstige Mittelstellung zwischen den zahlreichen bei uns vorhandenen umfangreichen mehr oder weniger allgemein gehaltenen Leitfäden bzw. Handbüchern der mikroskopischen Technik und Anleitungen für spezielle Untersuchungsmethoden der phytopathologischen Pflanzenobjekte. Im Teil I (70 S.) sind Mikroskop und mikroskopische Hilfsgeräte eingehend beschrieben. Im II. Teil (47 S.) ist die Mikrophotographie (Apparatur, Technik der Aufnahme, Negativ- und Positivprozesse usw.) behandelt. Eine am Schluß des Buches gegebene Tafel mit 16 Wiedergaben einer unter verschiedener Belichtung aufgenommenen bzw. kopierten Mikroaufnahme dient als anschauliches Beispiel. Der III. Teil ist der mikroskopischen Technik und speziellen phytopathologischen Untersuchung (Mykelenachweisung in Pflanzengewebe, besondere Färb- bzw. Färbungsmethoden usw.) gewidmet. Ausführlich sind Mikrotomtechnik sowie verschiedene Konservierung, Präparierung, Färbung der phytopathologischen Objekte beschrieben. Zum Schluß ist ein ausführliches Verzeichnis der einschlägigen westeuropäischen Literatur angegeben. Die Wiedergabe der Abbildungen ist infolge des schlechten Papiers meist mangelhaft.

M. Klemm, Berlin-Dahlem.

Die wichtigsten Schädlinge der Zuckerrübe. Landwirtschaftliche Lehrtafel II, herausgegeben vom Komitee für Chilefälscher in Berlin, Landwirtschaftliche Hauptberatungsstelle, Berlin W 9, Bellebuestr. 11 a.

Wir machen auf diese Tafel aufmerksam, die im Format von 90 × 60 cm nach Originalen von A. Dressel hergestellt ist und die wichtigsten Schädlinge und Krankheiten der Rüben in 16 farbigen Abbildungen wiedergibt.

Das Komitee für Chilefälscher hat außerdem eine kleine Tafel mit 16 farbigen Abbildungen von Unkräutern zur Erkennung der Bodenversauerung herausgegeben.

Weisentaferl. Wie der Bund für Vogelschutz in Coburg mitteilt, werden für die Plakate der Weisentaferl (vgl. Anzeige in Nachrichtenblatt 1930, Nr. 3) jetzt 40 Rpf. zuzüglich Porto und Verpackung berechnet.

Nademacher, Bernhard, Die Weisfähigkeit des Haisers, ihre verschiedenen Ursachen und Formen (zugleich ein Beitrag zum Symptomatik der Wasserbilanzstörungen). Archiv f. Pflanzenerbau 8, 456 bis 526, 1932.

Die vorliegende Arbeit ist der Versuch einer Monographie der Symptome. Beim Haiser als einer dafür besonders geeigneten Pflanze werden die verschiedenen Formen der Weisfähigkeit über die bisher viel Unklarheit bestand, gegeneinander abgegrenzt und auf ihre Ursachen zurückgeführt. Die weitaus häufigste Form der Weisfähigkeit beim Haiser ist die Flüssigkeit oder Fiedrigkeit, bei welcher namentlich im unteren Teil der Rispe zahlreiche Ährchen nur als kleine, weißgefärbte und taube »Flissen« oder »Fiederchen« ausgebildet sind. Sie geht nicht wie man früher annahm, auf die Tätigkeit der Blasen zurück, sondern beruht auf Störungen im Wasser- und Ernährungshaushalt der Pflanze. Insbesondere führt Wassermangel zur Zeit des höchsten Wasserbedarfs zu starker Flüssigkeit, und zwar in um so höherem Maße, je mehr die Pflanze auf starken Wasserverbrauch eingestellt war. Überernährung und Hunger führen ebenso wie eine fehlende Harmonie in der Zufuhr der wichtigsten Nährstoffe zu Flüssigkeit. Auch ein Zuwenig an sonstigen Wachstumsfaktoren, wie Wärme und Licht, bei mangelhafter Ausbildung der angelegten Rispe zur Folge. Der Auftreten flüssiger Ährchen ist lediglich Ausdruck einer zu früh bestimmter Zeit (während des Halmstehens bis zum Austreten der Rispe aus der Scheide) erfolgten Störung. Es ist in seinen Ursachen prinzipiell nicht verschieden von mangelhafter Anlage der Rispe überhaupt, vom Ausbleiben einzelner ganzer Ährchen oder der zweiten und dritten Körner im Einzelährchen, dem Ausbleiben des vollständig ausgebildeten Ährchens noch nach der Blüte oder mangelhafter Kornausbildung. Vielmehr ist nur das Bild der Störung je nach ihrem zeitlichen Eintritt verschieden. Die Erkenntnis der Ursachen der Flüssigkeit führt selbst zur Möglichkeit ihrer Verhütung, wobei die Regelung des Wasserhaushalts der Pflanze an der Spitze steht. Flüssigkeit im geringem Umfange ist mitunter auch nicht pathologisch und damit erbliche Eigentümlichkeit gewisser Haisergruppen, so besonders der Probsteier Haiser. Die Neigung der verschiedenen Haisersorten zur Flüssigkeit ist sehr unterschiedlich, woraus sich weitere Möglichkeiten der Schadenverhütung ergeben.

Flüssigkeit tritt weiter im Gefolge der Rotblättrigkeit oder Doherkrankheit auf, die erstmalig beschrieben und auf Störungen im Verhältnis der Wachstumsfaktoren zurückgeführt wird. Eine der Flüssigkeit ähnliche Form der Weisfähigkeit geht mit der Dörrenkrankheit, eine andere, besonders charakteristische Form mit der Urbarmachungskrankheit einher. Störungen der Wasserbilanz sind auch hier das verstärkende oder sogar das auslösende Moment. Die der Flüssigkeit des Haisers entsprechenden Schäden beim Ährengetreide kommen kurz zur Besprechung. Es wird dann weiter ein Überblick über diejenigen Formen der Weisfähigkeit beim Haiser gegeben, die auf parasitäre Ursachen zurückgehen. Von pflanzlichen Parasiten ist hier der Befall von Fusarium-Fußkrankheiten, von tierischen der Schaden durch Frühlingsfliegenlarven neben vielen andern zu erwähnen. Ein kurzes Eingehen auf rein mechanische Weisfähigkeitschäden zeigt schließlich wie verschiedenartig die Ursachen dieser Erscheinung sein können.

Autorreferat.

Aus dem Pflanzenschutzdienst

Krankheiten und Beschädigungen der Kulturpflanzen im Monat August 1932.

Witterungsschäden. Während die Witterung in der ersten Augustwoche noch unbeständig blieb, setzte dann hochsommerliche Wetter ein, welches, nur durch einige örtliche Hagelschlag verbundene Gewitter unterbrochen, bis zum Monatsende anhielt; allein in Ostpreußen traten in der ersten Monatshälfte verbreitete Regenfälle auf. Auch noch bei Monatsbeginn niedergehenden ausgiebigen Regenfälle hatten vielfach Rassechäden zur Folge; abgesehen von Bezirken Mitteldeutschlands, Mecklenburg, Ostpreußen, d.


Rheinprovinz und Württemberg melden Lagerung und Auswuchs des Getreides; in Ostpreußen und der Provinz Sachsen schadete der Regen außerdem an Hackfrüchten und Wiesen. Die nachfolgende Trockenheit verursachte Dürreschäden — außer in Braunschweig, Thüringen, Hessen, Baden und Bayern mit Pfalz — in allen Teilen des Reiches, besonders an Hackfrüchten. Auch über Schädigung an Getreide, Klee, Wiesen und Reben wurde berichtet. Vereinzelt schadete die Trockenheit Anpflanzungen von Laub- und Nadelbäumen. Hagelschäden an Getreide und Hackfrüchten verzeichneten Hannover, Ostpreußen, Schlesien, Provinz und Freistaat Sachsen, Thüringen, Westfalen; die Rheinprovinz, Baden und Württemberg außerdem an Reben. Durch Stürme wurde in Pommern, Anhalt und der Rheinprovinz großer Schaden an Obst angerichtet, in Hannover außerdem an Getreide und Heu, in der Provinz Sachsen an Nadelhölzern.

Unkräuter. Stellenweise starke Verunkrautung durch Bärenklau wurde aus Mecklenburg, Thüringen, Pfalz und Bayern sowie durch Ackerdistel aus Bremen, Provinz Sachsen, Rheinprovinz, Pfalz und Bayern gemeldet. — Stellenweise starkes Auftreten von Sahnfuß, Wiesenkerbel, Löwenzahn und Sauerampfer in Pfalz und Bayern.

Weichtiere. Schnecken traten stellenweise stark auf in Provinz und Freistaat Sachsen.

Insekten. Larven der Wiesenschnake schädigten stark in Hannover, stellenweise stark in Westfalen und Rheinprovinz. — Starke Drahtwurmschäden an Kohl und Kartoffeln: in Hannover, Lübeck, Ostpreußen, Oberschlesien und Westfalen; an Rüben: in Provinz Sachsen und Oberschlesien; an Weizen und Hafer: in Ostpreußen, Provinz Sachsen und Westfalen. — Engerlinge traten stellenweise stark auf an Rüben, Runkeln, Kartoffeln und Getreide (vgl. Karte I). — Erdraupen

Karte I



stellenweise stark in Hannover, Mecklenburg, Pommern, Brandenburg, Grenzmark und Freistaat Sachsen. — Blattläuse stark in Baden, stellenweise stark in Mecklenburg, Anhalt und Hessen-Nassau.

Wirbeltiere. Vereinzelt starke bis sehr starke Schäden verursachten Amseln im Freistaat Sachsen und Sperlinge im Freistaat Sachsen, Westfalen und Württemberg. — Eichhörnchen schädigten vereinzelt stark in Thüringen. — Die Verbreitung und Schäden durch Hamster nehmen zu in Provinz Sachsen, Anhalt und Freistaat Sachsen. — Vereinzelt starkes Auftreten der

Wühlmaus melden Hannover, Oldenburg, Freistaat Sachsen, Westfalen und Württemberg. — Feldmäuse sind in vielen Fällen stark aufgetreten in Hannover und stellenweise in Westfalen.


Getreide. Starker, stellenweise sehr starker Rostbefall an sämtlichen Getreidearten meldet Ostpreußen, an Weizen verbreitet in Nieder- und Oberschlesien, vereinzelt stark in Mecklenburg, Provinz und Freistaat Sachsen und Rheinprovinz. — Schwarzrost an Weizen vereinzelt außerordentlich stark (»Misernte«) in Nieder- und Oberschlesien, Ostpreußen (»Schaden = 50 %«). — Rostenrost an Hafer stark bis sehr stark in ganz Ostpreußen. — Fußkrankheiten stellenweise stark bis sehr stark in Nord- und Ostdeutschland, Provinz und Freistaat Sachsen und Rheinprovinz. — Schwarzrepilze an Weizen vereinzelt stark in Hannover, stark in Oberschlesien. — Weißährigkeit an Hafer stellenweise stark in Schleswig-Holstein. — Mutterkorn vereinzelt stark in Ostpreußen und Baden. — Blasenfuß stellenweise stark im Freistaat Sachsen, Westfalen und Rheinprovinz. — Die Getreidehalmwespe sehr stark in Oberschlesien (Kr. Kreuzburg: »seit 1903 nie so stark aufgetreten«), vereinzelt stark in Niederschlesien, Brandenburg und Provinz Sachsen.

Kartoffeln. Raßfäule verursachte häufig sehr starke Schäden in Ostpreußen und stellenweise in Westfalen. — Über Auftreten der Kraut- und Knollenfäule und des Kartoffelschorfes vgl. Karte II und III.

Karte II



Karte III



Rüben. Rübenrost vereinzelt sehr stark in Baden. — Herz- und Trockenfäule stellenweise sehr stark in Ostpreußen, Hessen-Nassau, Westfalen und Rheinprovinz, stark in Hannover, Nieder- und Oberschlesien. — Rübenfliege stark bis sehr stark in Hannover, Grenzmark, Nieder- und Oberschlesien, Brandenburg, Provinz Sachsen, Hessen-Nassau, Westfalen und Rheinprovinz. — Rübenblattwanze vereinzelt sehr stark in Hannover, Grenzmark, Niederschlesien und Provinz Sachsen.

Handels-, Öl- und Gemüsepflanzen. Weißfäule an Wruken sehr stark in Ostpreußen, stellenweise sehr stark in Mecklenburg. — Kohlhernie sehr stark in fast ganz Hannover an Kohl, sehr häufig an Steckrüben; stellenweise stark an Kohl in Schleswig-Holstein, Pommern, Nieder- und Oberschlesien, Brandenburg, Provinz Sachsen, Thüringen, Westfalen und Rheinprovinz; an Kohl und Wruken in Mecklenburg und Ostpreußen. — Spargelrost stark in Brandenburg, stellenweise stark im Freistaat Sachsen. — Gurkenfräse stellenweise stark in Lübeck, Mecklenburg und Freistaat Sachsen. — Brennfleckenkrankheit an Bohnen mehrfach stark in Oldenburg und Freistaat Sachsen. — Blattfleckenkrankheit an Sellerie stark im Freistaat Sachsen, vereinzelt stark in Hannover, Mecklenburg und Ostpreußen. — Braunfleckenkrankheit an Tomaten stellenweise stark in Hannover, Freistaat Sachsen, Pfalz, Unter- und Oberfranken und Schwaben. — Spinnmilben stellenweise stark an Bohnen in Bremen, an Bohnen und Gurken im Freistaat Sachsen und Brandenburg. — Erbsenwickler stellenweise sehr stark in Ostpreußen. — Kohleule und Rübenweißling vereinzelt sehr stark im Freistaat Sachsen. — Starkes und sehr starkes Auftreten der Kohlweißlingsraupen vgl. Karte IV. — Kohlfliegen traten stellenweise stark

berg, stellenweise stark in Mecklenburg, Niederschlesien, Provinz Sachsen, Westfalen, Rheinprovinz und Hessen. — Starkes Auftreten der Monilia melden Hannover stellenweise starkes Schleswig-Holstein, Eutin, Lübeck, Mecklenburg, Ostpreußen, Grenzmark, Brandenburg, Provinz Sachsen, Anhalt und Rheinprovinz. — Stellenweise starker Befall durch amerikanische Stachelbeermehltau in Ostpreußen. — Blattfallkrankheit an Stachel- und Johannisbeere stellenweise stark in Brandenburg, Freistaat Sachsen, Westfalen und Rheinprovinz. — Blattbranddürre der Johanni- und Stachelbeeren stellenweise stark im Freistaat Sachsen. — Vogelbeermotte an Apfel stellenweise stark im Freistaat Sachsen. — Stellenweise außerordentlich starkes Auftreten der Apfelmotte melden Niederschlesien, Freistaat Sachsen, vereinzelt starkes Oberschlesien. — Obstmaden verbreitet stark bis sehr stark in Hannover, Bremen, Hamburg, Freistaat Sachsen, Hessen und Bayern häufig stark in Oldenburg, Oberschlesien, Brandenburg, Anhalt, Westfalen und Rheinprovinz; stellenweise stark in Mecklenburg, Ostpreußen, Niederschlesien, Provinz Sachsen, Thüringen, Hessen-Nassau, Pfalz und Württemberg. — Kirschlattwespe vereinzelt sehr stark an Birne, Kirsche und Quitte in Westfalen. — Wespen schädigten stellenweise stark in Provinz und Freistaat Sachsen und Hessen-Nassau. — Blutlaus sehr stark in Eutin, stellenweise stark in Ostpreußen, Oberschlesien, Braunschweig und Rheinprovinz. — Schildlaus an Pflaumen stellenweise stark in Niederschlesien, Provinz und Freistaat Sachsen und Baden.

Neben. Peronospora stellenweise stark in Niederschlesien, Provinz Sachsen, Thüringen, Hessen-Nassau, Rheinprovinz und Baden. — Didium vereinzelt sehr stark im Freistaat Sachsen, Hessen-Nassau, Westfalen und Rheinprovinz. — Traubenwickler stellenweise stark in Hessen-Nassau, Rheinprovinz und Baden. (Die Eie und jungen Räumchen wurden in fast allen Fällen durch die anhaltende Hitze und Trockenheit vernichtet.).

Forstgeholze. Eichenmehltau (*Microsphaera quercina*) stark in Niederschlesien (Kr. Brieg: 100 %), Brandenburg (Kr. Zauch-Belzig: 80 %), Provinz Sachsen (Kr. Torgau: 80 %), Freistaat Sachsen (MS. Ramenz, Grimma und Borna). — Ulmensterben (*Graphium ulmi*) wurde festgestellt in Freistaat Sachsen (MS. Leipzig und Dresden), Hessen-Nassau (Kr. Kassel), Westfalen (Kr. Ledenburg, Recklinghausen, Minden, Paderborn, Hörter, Pippstadt, Soest, Anna, Bochum und Iserlohn), Württemberg (MS. Stuttgart). — Rote Spinne (*Tetranychus telarius*) an Linden sehr stark in Hamburg (Stadtgebiet), Westfalen (Kr. Minden, Paderborn, Anna, Lüdenschel Stadt). — Weitere Ausbreitung der Nonne (*Lymantria monacha*) meldet Hannover (alte Fraßgebiete zwischen Celle und Schwarmstedt, ferner im Kr. Lüdow, Soltau, Winsen, Rienburg). — Kiefernbuschhornblattwespe (*Lophyrus* sp.) stark im Freistaat Sachsen (MS. Ramenz). — Nachträglich für April bis Juni: Große braune Nusselkäfer (*Hylobius abietis*) in ganz Thüringen stark verbreitet.

Prüfungsergebnisse

Die »Cerejan-Nagbeize (U. 564)« ist im halbstündigen Tauchbeizverfahren gegen Weizenstinkbrand, Schneeschimmel und Streifenkrankheit der Gerste in 0,1 %iger Lösung gegen Haferflugbrand in 0,2 %iger Lösung wirksam. Gegen Schneeschimmel wirkt das Präparat im Kurznaßbeizverfahren in 1,75 %iger Lösung, wenn 3 l auf 100 kg verwendet werden. Die Angaben im Merkblatt Nr. 7. Auflage sind entsprechend zu berichtigen.

Karte IV



bis sehr stark auf in Hannover, Schleswig-Holstein, Pommern, Grenzmark, Nieder- und Oberschlesien, Brandenburg, Provinz Sachsen, Westfalen und Rheinprovinz. — Möhrenfliege stellenweise stark bis sehr stark in Ostpreußen und Westfalen. — Kohlerzgaummücke vereinzelt sehr stark in Westfalen, stellenweise stark in Hannover, Anhalt, Freistaat Sachsen und Thüringen. — Erdflöhe traten stellenweise sehr stark auf in Hannover, Oberschlesien, Provinz Sachsen, Anhalt, Hessen-Nassau und Rheinprovinz.

Obstgewächse. Schorf an Apfel und Birne war verbreitet stark bis sehr stark in Hannover, Hamburg, Ostpreußen, Brandenburg, Freistaat Sachsen und Württemberg.

Prüfung von Pflanzenschutzmitteln

Pyrethrinhaltige Pflanzenschutzmittel können nicht in das Pflanzenschutzmittelverzeichnis des Deutschen Pflanzenschutzdienstes aufgenommen werden, solange noch einwandfreie Methoden zur chemischen Kontrolle dieser Mittel fehlen. Dagegen ist es möglich, solche Präparate im Flugblatt Nr. 46 der Biologischen Reichsanstalt aufzuführen, wenn die Zusammensetzung der Mittel der Prüfstelle für Pflanzenschutzmittel vertraulich mitgeteilt wird und sich die Mittel als brauchbar erweisen. Für die Feststellung der Brauchbarkeit ist eine Gebühr von 30 *R.M.* für jede zu prüfende Konzentration und für jede Schädlingsart, gegen die das Mittel angewendet werden soll, zu bezahlen.

Anmeldung von Pflanzenschutzmitteln zur Prüfung

Die Anmeldungen sind spätestens einzureichen für Mittel gegen Streifenkrankheit der Wintergerste und

Fusarium	bis	1. September,
Weizenstinkbrand	»	15. »
Hafersflugbrand	»	1. Februar,
Fusikladium	»	1. »
Hederich und Ackerseif	»	1. »
Krankheiten und Schädlinge im Weinbau	»	1. »
Stachelbeermehltau	»	1. »
Erbsen	»	1. März,
Krankheiten und Schädlinge im Hopfenbau	»	1. »
Insekten mit beißenden Mundwerkzeugen	»	1. April,
Ankraut auf Wegen	»	1. »
Blatt- und Blattläuse	»	1. »
Rosenmehltau	»	1. Mai.

Verspätet eingehende Anträge werden ausnahmslos abgelehnt. Anträge, für die nicht innerhalb 3 Tagen der Gebührenvorschuß überwiesen wird, werden als nicht gestellt betrachtet.

Gesetze und Verordnungen

Deutsches Reich: Die Verordnung zur Abwehr der Einschleppung des Rellenwicklers vom 28. März 1929 (Reichsgesetzbl. I S. 83) ist dahin ergänzt worden, daß nunmehr auch die Einfuhr von Rellen-Schnittblumen, und zwar für die Zeit vom 15. März bis 30. November jedes Jahres, bis auf weiteres verboten ist.

Stadt Oppeln (Oberschlesien): Bekämpfung der Maulwurfsgrille. In einer auf Anregung der Hauptstelle für Pflanzenschutz von der Ortspolizeibehörde in Oppeln erlassenen Bekanntmachung vom 9. August 1932 (Stadtblatt des Stadtkreises Oppeln Nr. 64 vom 10. August 1932) werden alle Gartenbesitzer der Stadt aufgefordert, ohne Ausnahme sich an den Maßnahmen zur Bekämpfung der Maulwurfsgrille zu beteiligen. Als sicherste und auch billigste Abwehrmaßnahme wird das Abfangen der Schädlinge in eingegrabenen alten Konservenbüchsen empfohlen. Bei Säumigen würde die Polizeibehörde gezwungen sein, mit polizeilichem Zwange vorzugehen.

Thüringen: Bekämpfung des Frostspanners. Durch Verordnung des Thüring. Kreisamtes Gotha vom 10. August 1932 (Amts- und Nachrichtenblatt für Thüringen II Nr. 67 vom 20. August 1932, S. 966) werden die Polizeiverordnungen zur Bekämpfung des Frostspanners vom 16. Dezember 1929¹⁾ und vom 4. August 1930²⁾ auf den Gemeindebezirk Herbsleben ausgedehnt.

Bulgarien: Einfuhr von Obst, Früchten und Gemüse. Nach der Kgl. Verordnung vom 21. Januar 1931, Nr. 8 (Derzaven Vestnik Nr. 269 vom 5. März 1931), Artikel 23, ist die Einfuhr, Erzeugung, Einlagerung, Feilhaltung und der Verkauf von Obst, Früchten, Gemüse und Erzeugnissen daraus, die verborben, verfault, wurmig, unsauber, von Insekten oder anderen Tieren angegriffen sind, eine andere Veränderung erfahren haben oder nicht den ihnen eigentümlichen Geruch und Geschmack besitzen oder gesundheitsschädliche Metallverbindungen enthalten, verboten.

Die Einfuhr, die Einlagerung und der Verkauf von ausgewachsenen Kartoffeln ist verboten.

(Auszug aus Deutsches Handels-Archiv 1932, S. 1694.)

Frankreich: Einfuhr von Blumenzwiebeln und blühenden Pflanzen. Die Einfuhr der nachstehend aufgeführten ausländischen Waren darf nach dem Dekret vom 2. 2. 1932 (Journal Officiel de la République Française Nr. 28 v. 3. 2. 1932 S. 1286) nur im Rahmen von Kontingenten und entsprechend

den Vorschriften, die durch ministerielle Verordnungen festgesetzt werden, erfolgen: Blumenzwiebeln, Knollenpflanzen, Hyazinthen, Tulpen, Pflanzen mit Wurzelskoden, Maiglöckchen und Pflanzen ähnlicher Gattungen, im blühenden Zustand oder mit Knospen. (Auszug aus Deutsches Handels-Archiv 1932 S. 1843.)

Frankreich: Einfuhr von Frischobst. Nach einem Drahtbericht aus Paris ist durch eine im Journal Officiel vom 14. September 1932 veröffentlichte Verordnung des Landwirtschaftsministeriums vom 12. September 1932 mit Wirkung vom 1. Oktober 1932 ab für Frischobst aus Nr. 84 A des französischen Zolltarifs das Einfuhrebewilligungsverfahren eingeführt worden. Die Verordnung findet jedoch keine Anwendung auf Frischobst aus Ländern, die in Anwendung der Verordnung vom 29. Juli 1932 die Kontingente für die Einfuhr nach Frankreich selbst bewirtschaften.

(Industrie und Handel Nr. 213 vom 14. Sept. 1932 S. 7.)

Port. Guinea: Einfuhr von Pflanzen usw. Nach den Vorbemerkungen zum Zolltarif für die Kolonie Guinea — Geseleiche Verordnung Nr. 627 vom 21. Januar 1932 (Boletim Oficial Nr. 2, Sonderheft Nr. 4, vom 28. Januar 1932) —, Artikel 24, Ziffer 4, ist es verboten, Pflanzen einzuführen, aus Gegenden kommend, die von irgendeiner Pflanzenkrankheit heimgeheft sind, sofern nicht ein günstiges Gutachten der zuständigen Landwirtschaftsbehörde vorliegt.

(Auszug aus Deutsches Handels-Archiv 1932, S. 1518.)

Jugoslawien: Freigabe der Durchfuhr lebender Pflanzen. Durch Entscheidung des Landwirtschaftsministers vom 19. Juni 1932 ist die Durchfuhr lebender Pflanzen durch Jugoslawien freigegeben worden, so daß hierfür nicht mehr die Beibringung eines phytopathologischen Zeugnisses erforderlich ist.

(Industrie und Handel Nr. 199 vom 27. August 1932 S. 5.)

Jugoslawien: Freigabe der Einfuhr von Samen tropischer Pflanzen für industrielle Zwecke. Der jugoslawische Landwirtschaftsminister hat mit seiner Entscheidung vom 11. August 1932 — Nr. 46141/II — die Einfuhr tropischer Industriepflanzen freigegeben, so daß hierfür die Beibringung eines Gesundheitszeugnisses nicht mehr erforderlich ist.

(Industrie und Handel Nr. 220 vom 22. Sept. 1932 S. 6.)

Luxemburg: Bewilligungszwang für die Einfuhr von frischen Trauben, Aprikosen, Pfirsichen und Pflaumen. Laut großherzogl. Beschluß vom 12. August unterliegt die Einfuhr von frischen Trauben, Aprikosen, Pfirsichen und Pflaumen einer besonderen Bewilligung, die im Namen des Staatsministers von der Lizenzkommission ausgestellt wird.

(Industrie und Handel Nr. 197 vom 25. August 1932, S. 6.)

Neuseeland: Nach Neuseeland bestimmte Waren nicht in Heu, Stroh und Häcksel verpacken! In einem Rundschreiben hat der Londoner Oberkommissar für Neuseeland darauf aufmerksam gemacht, daß vielfach das in Neuseeland zur Vermeidung der Einschleppung der Maul- und Klauenpest erlassene Verbot der Verwendung von Heu, Stroh oder Häcksel als Verpackung von ausländischen Firmen, die ihre Waren nach Neuseeland einführen, unbeachtet gelassen werde. Die neuseeländische Regierung werde in Zukunft bei allen in Heu, Stroh, Häcksel usw. verpackten Gütern die Einfuhr nicht zulassen.

(Industrie und Handel Nr. 217 vom 19. Sept. 1932 S. 8.)

Niederlande: Einfuhr- und Durchfuhrverbot für französische Kartoffeln und Gemüse. Der Wirtschaftsminister hat eine Verordnung erlassen, wonach mit Wirkung vom 22. September 1932 die Einfuhr und Durchfuhr französischer Kartoffeln verboten wird. Weiterhin ist vom selben Datum an auch die Einfuhr und Durchfuhr französischer Gemüse bis zum 14. Oktober 1932 mit der Maßgabe verboten, daß Sendungen zur Einfuhr zugelassen werden können, die von einer schriftlichen Erklärung des französischen Pflanzenschutzdienstes versehen sind, wonach die Frischgemüse nicht vom Koloradofäfer infiziert sind und aus Plätzen stammen, in denen der Koloradofäfer in einer Entfernung von 200 km bisher nicht vorgekommen ist. Es soll jedoch eine Ausnahme für Sendungen gemacht werden, die ein Gewicht von 50 kg nicht überschreiten und die ausschließlich über die Zollstation Roosendaal eingeführt werden. Bei letzteren Sendungen muß sich aber ebenfalls eine Erklärung des französischen Pflanzenschutzdienstes befinden, daß bei ihnen keine Gefahr für eine Verbreitung des Koloradofäfers besteht.

(Industrie und Handel Nr. 214 vom 15. Sept. 1932 S. 7.)

Österreich: Vorschriften für die Obstaushfuhr nach Deutschland. Obstsendungen aus Österreich nach Deutschland, sofern sie hinsichtlich ihrer Qualität von den österreichischen Prüfungsstellen zur Ausfuhr zugelassen wurden, werden an den Grenzbahnhöfen von deutschen Sachverständigen einer Untersuchung auf Schädlingfreiheit unterzogen, wenn sie in Originalpackung verfrachtet werden. Sendungen in loser Schüttung bedürfen eines Gesundheitszeugnisses der österreichischen Prüfungsstelle, worin das Freisein der Sendung und jener Betriebe, aus welchen das Obst

¹⁾ Amtl. Pflanzenschutzbest. Bd. III Nr. 2 S. 80.

²⁾ Amtl. Pflanzenschutzbest. Bd. III Nr. 2 S. 81.

stammt, von der San-José-Schildlaus bestätigt wird. Bei Sendungen, die über die Tschechoslowakei nach Deutschland gelangen, überzeugen sich die deutschen Prüfungsorgane vom unbeschädigten und gut verschlossenen Zustand des Güterwagens.
(Industrie und Handel Nr. 214 vom 15. Sept. 1932 S. 8.)

Philippinen: Einfuhrverbot für verschiedene Pflanzen. Im Anschluß an die Verwaltungsverordnung vom 19. März 1932, die die Ein- und Ausfuhr von Pflanzen nach und von den Philippinen gesetzlich regelt, hat die Philippinische Regierung noch durch Verordnung vom 21. Mai 1932 Bestimmungen erlassen, denen zufolge ab 1. August 1932 die Einfuhr alles Pflanzenmaterials der Gattung der Banane, Kokosnuß, Zuckerrohr, Reis, Ananas, Bambus und Tabak sowie verschiedener Zitronenarten, Maguey und Sisal verboten ist. Für gewisse Zwecke, namentlich für Versuchszwecke, kann jedoch auch von diesen Pflanzen eine bestimmte Menge gemäß den Bestimmungen der Verordnung Nr. 10 vom 19. März 1932¹⁾ eingeführt werden. Die Pflanzen haben aber eine Quarantänezeit durchzumachen und werden erst freigegeben, nachdem erwiesen ist, daß sie frei von schädlichen Insekten und Pflanzenkrankheiten sind. Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung werden unter Strafe gestellt.

(Industrie und Handel Nr. 226 vom 29. Sept. 1932.)

Rußland (U. d. S. S. R.): Einfuhr von Pflanzen usw. In dem durch Verordnung vom 16. November 1931, Nr. 142/oper, bekanntgegebenen »Verzeichnis der Waren, deren Einfuhr für den persönlichen Bedarf des Empfängers in Postsendungen bewilligungsfrei gestattet wird« sind als Norm der Einfuhr genannt:

Samen, außer Baumwollsamens: nicht über 500 g.
Lebende Pflanzen, Blumenzwiebeln, Wurzelstöcke und Wurzeln von Zier- und Blumenpflanzen, die zu Zierzwecken verwendet werden, geschnittene Blumen, Blätter und andere Pflanzenteile: nicht über 5 kg Rohgewicht.
Früchte und Beeren: nicht über 5 kg Rohgewicht.
(Auszug aus Deutsches Handels-Archiv 1932, S. 1541.)

Schweiz: Neues Verzeichnis der Einfuhrbeschränkungen. Die Oberzolldirektion hat eine Zusammenstellung sämtlicher Waren, welche der Einfuhrbeschränkung und -kontingentierung unterworfen sind, nach Tarifnummern geordnet und auf den Stand des 6. September 1932 bereinigt, herausgegeben. Das Verzeichnis enthält auch die erhöhten Zollsätze (sog. Überzölle) für kontingentierbare Waren sowie die durch die Kontingentierung und Beschränkung betroffenen Länder und die Gebühren für die Erteilung von Einfuhrbewilligungen.

Die Broschüre kann zum Preise von 50 Rpf zuzüglich Porto bei den nachgenannten Stellen bezogen werden:

Materialverwaltung der Oberzolldirektion, Bern,
Zollkreisdirektionen Basel, Schaffhausen, Chur, Lugano, Lausanne und Genf;
Hauptzollämter in Luzern, Zürich und St. Gallen.

Bemerkenswert ist, daß in diesem Verzeichnis einige bisher noch nicht veröffentlichte Einzelheiten aus der Kontingentierungspraxis mit enthalten sind. So findet sich hinsichtlich der Einfuhrbeschränkung für Bäume und Sträucher (Pos. 209) die Bemerkung:

»Eine generelle Bewilligung ist erteilt für:

1. Reben und Rehholz, soweit die vorgeschriebene Bewilligung der Abteilung für Landwirtschaft vorliegt.
2. Frische Zweige ohne Früchte, Blüten oder Blütenknospen, für die Kranzbinderei.«

(Auszug aus Industrie und Handel Nr. 220 vom 22. Sept. 1932 S. 6.)

¹⁾ Nachr. Bl. 1932, Nr. 9, S. 78.

Spanien: Einfuhr von Kartoffeln. Nach Mitteilung der spanischen Regierung ist die Einfuhr von Kartoffeln aus Deutschland nach Spanien unter den alten Bedingungen der spanischen Verfügung vom 4. Juni 1928 wieder zugelassen. Nach dieser Verfügung, die der in den Amtlichen Pflanzenschutzbestimmungen Band II, Nr. 2, auf Seite 80 abgedruckten Verbalnote der spanischen Botschaft in Berlin vom 27. Juni 1928 zugrunde liegen müssen die zur Einfuhr nach Spanien bestimmten Kartoffelsendungen von einem Ursprungszeugnis des Pflanzenschutzdienstes des Ursprungslandes begleitet sein, in dem bescheinigt wird, daß die Kartoffeln aus einer Gegend stammen, die von Kartoffelkrebs frei ist und zumindest 20 km von jedweder von Kartoffelkrebs befallenen Anbaufläche entfernt liegt. Die Kartoffeln unterliegen bei ihrer Einfuhr einer Nachprüfung durch den spanischen Pflanzenschutzdienst und müssen vom Kartoffelkrebs frei befunden werden.

Türkei: Einfuhr von lebenden Pflanzen usw. Durch eine am 20. August 1932 veröffentlichte Verordnung vom 24. Juli 1932 die Einfuhrkontingentierung für das 3. Vierteljahr 1932 neu geregelt worden. Die frühere Freiliste G¹) ist vom 1. September ab aufgehoben. Die Waren dieser Liste sind in die Hauptkontingentsliste für die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1932 aufgenommen worden.

Samen, Blumen, frische Blumenwurzeln und Pfropfpflanzen dürfen nur mit Erlaubnis des Landwirtschaftsministeriums eingeführt werden.

(Auszug aus Industrie und Handel Nr. 207 vom 6. Sept. 1932 Beilage.)

Tschechoslowakei: Einfuhr von lebenden Pflanzen und frischen Pflanzenteilen. Der Bewilligungszwang für die Einfuhr von Christbäumen und Christbäumchen²⁾ ist durch Verordnung vom 8. August mit Wirkung vom 12. August 1932 ab aufgehoben.

(Auszug aus Industrie und Handel Nr. 208 vom 7. Sept. 1932 S. 7.)

Ungarn: Pflanzenschutzbestimmungen. Im ungarischen Amtsblatt »Budapesti Közlöny« vom 28. 8. 1932 — Nr. 194 — wird eine Verordnung des Ackerbauministers Nr. 49 000/1932 veröffentlicht, durch die eine Neuregelung des Pflanzenschutzes insbesondere in organisatorischer Hinsicht, erfolgt.

(Industrie und Handel Nr. 218 vom 20. Sept. 1932 S. 4.)

Berichtigung.

Die Preise für die Anschauungskästen des Kartoffelkäfers betragen:

Bei Abnahme bis 100 Stück	0,30 R.M. das Stück
» » über 100 bis 500 Stück	0,28 » » »
» » über 500 bis 1000 Stück	0,27 » » »

ausschließlich Porto und Verpackung. Bei noch größerer Mengenabnahme Preis nach vorheriger Vereinbarung.

Dieser Nummer liegen die »Amtlichen Pflanzenschutzbestimmungen« Band IV, Nr. 4, bei.

¹⁾ Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst Nr. 4 S. 32.

²⁾ Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst Nr. 4 S. 32.

Der Phänologische Reichsdienst bittet bis zum 1. Dezember 1932 um folgende Beobachtungen:

Beginn der Ernte von:

Kartoffeln
Rüben
Wein (Sorte!)

Beginn der Aussaat von:

Winterroggen
Winterweizen

Beobachter

(Name und Anschrift (Per Post) und Straße.)

Es wird um Zusendung der Daten an die Zentralstelle des Deutschen Phänologischen Reichsdienstes in der Biologischen Reichsanstalt, Berlin-Dahlem, Königin-Luise-Str. 19, direkt oder über die zugehörige Hauptstelle für Pflanzenschutz als portofreie Dienstsache (also unfrankiert) gebittet.